## Preparazioni galenico-magistrali

## IDROSSIZINA CLORIDRATO 5% soluzione orale

SC	CHEDA DELLA PR	EPARAZIONE GALENICA
COMPOSIZIONE	quantità	Principio attivo e/o eccipienti
	grammi 5	IDROSSIZINA CLORIDRATO POLVERE
	grammi 0,5	SODIO IDROSSIDO PASTIGLIE
	ml 100	ACQUA DEPURATA F.U.
MODALITA' DI PREPARAZIONE	SCIOGLIERE L'IDROSSIZINA CLORIDRATO IN ACQUA. AGGIUNGERE CIRCA 0,500 G DI SODIO IDROSSIDO PASTIGLIE*. PRELEVARE CON UNA SIRINGA MUNITA DI FILTRO 0,22µm E TRASFERIRE IN UN FLACONE DA 100 ml	
PROPRIETA' TERAPEUTICHE	TRATTAMENTO DEGLI STATI ANSIOSI A BREVE TERMINE. DERMATITI ALLERGICHE ACCOMPAGNATE DA PRURITO	
<i>IMPIEGO</i>	PER OS (DA SONDINO NASO-GASTRICO)	
AVVERTENZE	USO INTERNO.	
*	p.a.:NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.	
Xn		
(p.a.)		
CONSERVAZIONE	IN FRIGORIFERO,IN RECIPIENTI BEN CHIUSI DI VETRO AMBRATO.	
VALIDITA'	30 GIORNI	
(si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato)		
CONFEZIONE	FLACONE DA 50 ml	

 $<sup>^{\</sup>ast}$  OCCORRE AGGIUNGERE SODIO IDROSSIDO PER RAGGIUNGERE UN pH TRA 5-7. EFFETTUARE LE DOVUTE PROPORZIONI PER VOLUMI DIFFERENTI DI SOLUZIONE DI IDROSSIZINA CLORIDRATO.

Rev 0 del 26apr11 A cura della Farmacia dell' A.O. Ospedale Civile di Legnano - dott. Luca Varalli